




Hechos sobre el abuso de drogas durante el embarazo

Entendiendo los efectos de drogas ilícitas usadas durante el embarazo

Uso de personas con 12 años de edad o mayor por el mes pasado y el año pasado: 2002-2012



Fuente: Instituto Nacional del Abuso de Drogas: Encuesta Nacional de Uso de Drogas y Salud (2012)



Actividades de Prevención y la Comunidad

Entrenamiento de Exposiciones Prenatales y Conducta Maternal de Alto Riesgo es ofrecido para:

- Individuos, Parientes, Familias, y Grupos de Adopción
- Organizaciones Locales, Estatales, y Regionales
- Proveedores de Salud Medical y Conductual
- Organizaciones del Servicio a la Comunidad
- Organizaciones Legales

12 Executive Park Drive NE
Atlanta, GA 30329
404-712-9829

MotherToBaby Georgia: Servicio de Información Teratológica

Provee información a base de estudios gratis sobre medicamentos y otras exposiciones durante el embarazo y la lactancia.



MotherToBaby
GEORGIA
Medications & More During Pregnancy & Breastfeeding
Ask The Experts

www.mothersbabyga.org
mothersbaby@emory.edu

855.789.6222

Hechos sobre la heroína

Según la Encuesta Nacional de Uso de Drogas y Salud (2012), aproximadamente 669,000 americanos reportaron usar heroína el año pasado, una cantidad que ha aumentado desde 2007. La heroína es un opio ilegal, parte de la misma clase de drogas como OxyContin y Percocet. Estas drogas tienen un alto riesgo de adicción.

Para más información por favor vea "Hechos sobre el Uso de Opiáceos Durante el Embarazo"

www.emory.edu/MSACD

Uso de drogas ilícitas durante el embarazo ha sido asociado con varios afecciones adversas:

- Bajo peso a nacer
- Nacimiento prematuro
- Síndrome de la muerte súbita infantil (SIDS)
- Aumento en la tasa de muerte infantil
- Síndrome de abstinencia neonatal (NAS)

Investigaciones de los efectos de largo plazo del abuso de drogas prenatal en desarrollo, cognición, y conducta son complicadas porque las mujeres que participaron en estas investigaciones podrían estar abusando otras drogas, cigarrillos, o alcohol. La calidad y constancia del hogar puede afectar resultados para el niño.

Los hijos de mujeres que abusaban drogas durante el embarazo deben ser identificados tempranamente y provistos con los servicios médicos, sociales, y educativos que necesitan para alcanzar su potencia.

Es importante recordar que en cada embarazo todas mujeres tienen un riesgo de 3 a 5% tener un bebe con defectos de nacimiento, a pesar de abusar drogas o no. Factores genéticos y ambientales pueden causar defectos de nacimiento. Sin embargo, no sabemos la cause de aproximadamente 60 a 70% de los defectos de nacimiento.



The Center for MSACD
12 Executive Park Drive NE 2nd floor
Atlanta, GA 30329
(404) 712-9829 emory.edu/MSACD



EMORY
UNIVERSITY



The Center for MSACD is funded in part by the Georgia Department of Behavioral Health and Developmental Disabilities (DBHDD)